

Vaccin dcaT

Vaccin combiné contre la diphtérie,
la coqueluche et le tétanos

« LA VACCINATION,
une bonne protection »



La personne qui reçoit ce vaccin se protège contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos et leurs complications.

Maladies

Diphtérie

La diphtérie cause:

- des maux de gorge importants;
- une forte fièvre;
- des problèmes respiratoires et cardiaques.

Coqueluche

La coqueluche cause:

- de violentes quintes de toux pouvant durer des mois;
- de la difficulté à manger, à boire et à respirer.

Tétanos

Le tétanos cause:

- des spasmes musculaires de la mâchoire;
- des spasmes des muscles du cou;
- des spasmes musculaires du corps.

Les complications possibles sont:

- une paralysie;
- la mort (5 à 10 % des cas).

- une pneumonie;
- des convulsions;
- des dommages au cerveau (1 cas pour 11 000);
- la mort (0,4 % chez les bébés).

- la mort (10 % des cas).

C'est à vous de prendre rendez-vous au CLSC de votre centre de santé et de services sociaux (CSSS) ou chez votre médecin pour faire vacciner votre enfant.

Prochain rendez-vous pour la vaccination : _____

Santé
et Service



Renseignements sur le vaccin dcaT

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos et leurs complications. Ce vaccin est administré aux personnes âgées de 4 ans ou plus qui ont besoin de protection contre ces 3 maladies.

Le vaccin combiné contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos est sécuritaire. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée. Les symptômes ressentis après la vaccination ne sont pas nécessairement causés par le vaccin.

Les réactions possibles au vaccin sont:

- De la douleur (50 % des cas ou plus), de la rougeur, un gonflement (10 à 49 %) à l'endroit où l'injection a été faite.
- Une petite bosse pendant quelques semaines à l'endroit où l'injection a été faite (1 à 9 cas pour 1 000).
- De la fièvre (1 à 9 % des cas).
- Un abcès stérile à l'endroit où l'injection a été faite (1 à 9 cas pour 100 000).
- De la fatigue et un mal de tête (50 % ou plus), un malaise, des étourdissements, des nausées, de la diarrhée, des frissons (10 à 49 %), des vomissements (1 à 9 %).
- Une douleur intense et de la faiblesse dans le bras durant plusieurs semaines (1 à 9 cas pour 100 000).

Ce qu'il faut faire:

- Appliquer une compresse humide froide où l'injection a été faite.
- Prendre un médicament du type acétaminophène ou ibuprofène si la température est de 38 °C ou plus.
- Consulter un médecin selon la gravité de la réaction.

Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. Si une réaction allergique grave devait survenir, elle débiterait dans les minutes qui suivent et la personne qui administre le vaccin peut traiter cette réaction. C'est pourquoi il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration du vaccin.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui administre le vaccin ou consultez Info Santé 9-1-1.